

Måndagen 20.2. har vi 1:a mellanförlöret, som omfattar kap. 8-11 med undantag för kap. 9.10 i upplaga 4, som behandlar Fourier-serier och kap. 10.7 i upplaga 5, som behandlas matrisräkning med Maple. I gengård anger kap. 17.9 i uppl. 4, som behandlar lösning av ordinära differentialekvationer mha. serier (kap. 9.10 i uppl. 5). Till mellanförlöret får vanliga funktionsräknare medtagas. Tabellsamtningar och mer avancerade räknare får inte medtagas.

På insidan av detta blad finns uppgifterna från 3:e datorövningen i löstas. Uppgifterna till varans 1:a datorövning torsdagen 26.2. delas ut separat.

På baksidan finns fjolårets mellanförlörs nr. 1.

Fr: 1) 11.5.13. Mha. detta får vi metoder att göra sledor av ellipsor med euklisk passare och linjal.

2) 11.5.24.

3) 11.5.16. I uppl. 4 förekommer ett olyckligt tryckfel. Det skall stå  $\kappa(\theta) = \frac{[2(f'(\theta))^2 + (f(\theta))^2 - f(\theta) \cdot f''(\theta)]}{[(f'(\theta))^2 + (f(\theta))^2]^{3/2}}$

Obs!

4) 11.5.21 (Vivianis kurva från i fredags)

Demo: Vi visar att kurvan  $\bar{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j}$  har

evolutan  $\bar{r}_e(t) = \bar{x}(t)\hat{i} + \bar{y}(t)\hat{j}$ , där

$$\bar{x}(t) = x(t) - y'(t) \cdot \frac{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)} \quad \text{och}$$

$$\bar{y}(t) = y(t) + x'(t) \cdot \frac{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}$$

(förtats att kurvan är "tillräckligt smäll").

Fr: 1) 11.R.7 (Review) 2) 11.R.9 3) 11.R.10


4) 11.R.11 (använd formlerna från onsdagens demo ovan).

Tillsammans med förra fredagens demo ger uppg. 2-4) den isoktona pendeln. För en vanlig matematisk pendel beror svängningsiden nämligen på utslagsvinkelns, även om den är nästan konstant för små svängningar.

Demot på insidan

Demo: Kardioiden är bekant från demo-övningen om  $\sqrt{3}$ . Vi visar att kardioidens evoluta är en kardioid, skalad  $\frac{1}{3}$  och vriden  $180^\circ$  som i figuren till höger.

Med den mindre kardioiden kan vi alltså återskapa den större (den mindre kardioidens evolvent) via en penna och en liten snöre!



Fjolårets mellanförlös 1 nedan ↴

## Mat-1.452 Svenskspråkig grundkurs i matematik 2

Mellanförhör nr 1 21.02.2005

Fyll i tydligt *på varje svarpapper* samtliga uppgifter. På *förförskod och -namn* skriv kursens kod, namn samt *slutförhör* eller *mellanförhör* med ordningsnummer. Utbildningsprogrammen är ARK, AUT, BIO, EST, ENE, GMA, INF, KEM, KJO, KTA, KON, MAK, MAR, PUU, RAK, TFY, TIK, TLT, TUO, YHD.

Vid detta mellanförhör får vanliga funktionsräknare användas.

Tabellsamlingar och mer avancerade räknare får inte användas.

Om ni misstänker att det förekommer något tryckfel, fråga!

1. Vi studerar en ellips  $\mathcal{E}$  och en hyperbel  $\mathcal{H}$  i planet. Ellipsens toppar är hyperbelns brännpunkter och hyperbelns toppar är ellipsens brännpunkter. Ellipsens ekvation är  $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$ . Bestäm hyperbelns ekvation samt ekvationerna för dess asymptoter. (Hos kägelsnitt heter 'topp' *vertex* på engelska och 'brännpunkt' heter *focus*.)
2. Vi studerar kurvan som ges av ekvationen  $(x^2 + y^2)^3 = 27x^2y^2$ .
  - a) Skriv om ekvationen med hjälp av polära koordinater (1p.)
  - b) Skissa kurvan (1p.)
  - c) Visa att kurvan får plats i en kvadrat med sidlängden 4 (2p.)
  - d) Beräkna arean hos området innanför kurvan (2p.)
3. Serien  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$  är en konvergent överharmonisk serie, så den har alltså en summa  $S$ . Bestäm hur stort  $N$  måste väljas för att delsumman  $s_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^4}$  skall approximera summan  $S$  med ett fel som är  $< 1/1000$ .  
(Med metoder från Grundkurs 3 kan man beräkna summan  $S$  exakt också:  $S = \pi^4/90$ . Använd gärna detta för att *kontrollera* svaret.)
4. Rymdkurvan  $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + 2t\vec{j} + \ln t\vec{k}$  närmar sig negativa  $z$ -axeln, då  $t \rightarrow 0^+$  och blir alltmer parallell med positiva  $x$ -axeln, då  $t \rightarrow \infty$ , eftersom  $x$ -koordinaten ökar mycket snabbare än  $y$ - och  $z$ -koordinaten, då parametern  $t$  växer över alla gränser.
  - a) Beräkna längden  $s$  hos den delen av kurvan, som finns mellan punkten, där kurvan skär  $xy$ -planet och punkten, som svarar mot  $t = 2$ .
  - b) Krökningsradien hos en rymdkurva  $\vec{r}(t)$  ges som bekant av  $\rho(t) = |\vec{r}'(t)|^3 / |\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|$ . Bestäm minimala krökningsradien  $\rho_{min}$  hos vår rymdkurva.  
(Svar:  $s \approx 3.69$ ,  $\rho_{min} \approx 2.17$ .)

Nyttiga (?) formler:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1, \cos^2 t = (1 + \cos(2t))/2, \sin^2 t = (1 - \cos(2t))/2,$$

$$\sin(2t) = 2 \sin t \cos t, \cos(2t) = \cos^2 t - \sin^2 t,$$