

Laskuharjoitus 4, 15.10.2008.

**Laskuharjoitus 4**

**4.1.** Todista, että  $(\mathcal{M}_G, (\alpha, \beta) \mapsto \alpha * \beta)$  on monoidi. Olkoon  $\delta_x \in \mathcal{M}_G$  määritelty  $\delta_x(x) = 1$  (jolloin toki  $\delta_x(y) = 0$ , kun  $y \neq x$ ); laske  $\delta_x * \delta_y$ . Päättele, että  $\mathcal{M}_G$  on kommutatiivinen jos ja vain jos  $G$  on kommutatiivinen. Miksi  $\mathcal{M}_G$  ei ole ryhmä, kun  $|G| > 1$ ?

**4.2.** Varustetaan  $G = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$  tavallisella ryhmän rakenteella. Olkoon  $m \in \mathbb{Z}^+$ . Määritellään näytemitta  $\alpha_m \in \mathcal{M}_G$  siten, että

$$\alpha_m(z) = \begin{cases} m^{-1}, & \text{kun } z \in \{e^{i2\pi j/m}\}_{j=0}^{m-1}, \\ 0, & \text{muutoin.} \end{cases}$$

Olkoon

$$f : G \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) z^n, \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| < \infty.$$

Laske  $\int_G f d\alpha_m$  ja  $\int_G f d\mu_G$ , missä  $\mu_G$  on ryhmän  $G$  Haar-mitta (joka onkin hyvin tuttu...)

**4.3.** Piste  $x \in \mathbb{S}^2$  voidaan tunnetusti kirjoittaa pallokoordinaateissa muodossa

$$x(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \cos(\phi) \sin(\theta) \\ \sin(\phi) \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix},$$

missä  $0 \leq \theta \leq \pi$  ja  $0 \leq \phi < 2\pi$ .

(a) Olkoon  $q = x(0, 0) \in \mathbb{S}^2$ ,  $q$  on siis yksikköpallon pohjoisnapa. Olkoon  $((A, x) \mapsto Ax) : \text{SO}(3) \times \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$  on toiminta tavalliseen tapaan. Kuinka parametrisoit isotropia-aliryhmän  $\text{SO}(3)_q$  käyttäen kulmaa  $\psi \in [0, 2\pi[$ ?

(b) Tiedämme, että  $\mathbb{R}^3$ :n Lebesgue-mitta  $\mu_{\mathbb{R}^3}$  on rotaatio-invariantti ja että pallokoordinaateissa

$$d\mu_{\mathbb{R}^3} = r \sin(\theta) d\phi r d\theta dr.$$

Johda tästä lauseke

$$d\mu_{\text{SO}(3)} = \frac{1}{8\pi^2} \sin(\theta) d\phi d\theta d\psi.$$

Muistutus:  $\int_G f d\mu_G = \int_{G/H} \int_H f(xh) d\mu_H(h) d\mu_{G/H}(xH)$ ; nyt  $G = \text{SO}(3)$ ,  $H = \text{SO}(3)_q$ ...

**4.4.** Olkoon  $\phi : G \rightarrow \text{Aut}(\mathcal{H})$  kompaktin ryhmän  $G$  vahvasti jatkuva esitys Hilbert-avaruudella  $\mathcal{H}$ . Todista, että  $\mathcal{H}$ :lla on olemassa  $\phi$ -invariantti sisätulo  $(u, v) \mapsto \langle u, v \rangle_\phi$ , toisin sanoen

$$\langle \phi(x)u, \phi(x)v \rangle_\phi = \langle u, v \rangle_\phi$$

kaikilla  $x \in G$  ja kaikilla  $u, v \in \mathcal{H}$ . Siten  $\phi$  on unitaariesitys tämän sisätulon suhteen!