

1. Tarkastamme integraalia

$$\int_C (3x - 2y) dx + (y + 2z) dy - x^2 dz.$$

a) Kirjoita integraali muotoon $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ (ts. hae \mathbf{F}). Onko \mathbf{F} konservatiivinen? Myönteisessä tapauksessa hae potentiaalifunktio.

b) Laske integraali pitkin käyrää $\begin{cases} x = z^2 \\ z = y^2 \end{cases}$ pisteestä $(1, 1, 1)$ pisteeseen $(0, 0, 0)$.

Ratkaisu. a) Integraali voidaan kirjoittaa $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, missä

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (3x - 2y) \mathbf{i} + (y + 2z) \mathbf{j} - x^2 \mathbf{k}.$$

Tämä vektorikenttä ei ole konservatiivinen, sillä esimerkiksi

$$\frac{\partial}{\partial y}(3x - 2y) = -2 \neq 0 = \frac{\partial}{\partial x}(y + 2z).$$

b) Annetun käyrän yhtälöt voidaan kirjoittaa muotoon $\begin{cases} x = y^4 \\ z = y^2 \end{cases}$. Pisteet $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ ja $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ toteuttavat nämä yhtälöt, eli ovat käyrällä. Asettamalla $y = t$ saadaan käyrälle parametriesitys $\mathbf{r}(t) = t^4 \mathbf{i} + t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$. Jotta suunnistus olisi oikea, eli jotta $y(t) = t$ vähenisi 1:stä 0:aan, täytyy antaa $t : 1 \rightarrow 0$. (Toinen tapa olisi asettaa $y = -t$ missä $t : -1 \rightarrow 0$ jolloin saadaan parametriesitys $\mathbf{r}(t) = t^4 \mathbf{i} - t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$.)

Saadaan $\mathbf{r}'(t) = 4t^3 \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2t \mathbf{k}$, ja $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (3t^4 - 2t) \mathbf{i} + (t + 2t^2) \mathbf{j} - t^8 \mathbf{k}$,

joten

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_1^0 \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\mathbf{r}'(t) dt \\ &= - \int_0^1 [(3t^4 - 2t)4t^3 + (t + 2t^2) \cdot 1 - t^8 \cdot 2t] dt \\ &= - \int_0^1 (-2t^9 + 12t^7 - 8t^4 + 2t^2 + t) dt \\ &= - \left(-\frac{2}{10} + \frac{12}{8} - \frac{8}{5} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = -\frac{13}{15}.\end{aligned}$$

2. Tarkastamme integraalia

$$\iint_G \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} dA,$$

kun G on 2-säteisen ympyrän 4. kvadranttiin jäävä alue. Tiedämme, että $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, joten integraali on selvästi epäoleellinen. Suppeneeko se? (Integraalia ei tarvitse laskea, mikäli se suppenee.)

Ratkaisu. (Integraali on epäoleellinen, sillä $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$, ja $\sqrt{x^2 + y^2} > 0$ kun $(x, y) \neq (0, 0)$, jolloin

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \infty$$

Integrandi ei vaihda merkkiä alueessa G , sillä $\sin r \geq 0$ kun $0 \leq r \leq 2$, missä $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Alueen symmetrian ja integrandin muodon takia on edullista siirtyä napakoordinaatteihin, jolloin $dA = r d\theta dr$ ja aluetta

G vastaa alue $H = \{[r, \theta] \mid 0 \leq r \leq 2, \frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi\}$. Saadaan

$$\begin{aligned} \iint_G \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} dA &= \iint_H \frac{\sin r}{r^2} r d\theta dr \\ &= \int_0^2 \frac{\sin r}{r} dr \int_{3\pi/2}^{2\pi} d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^2 \frac{\sin r}{r} dr. \end{aligned}$$

Viimeinen integraali suppenee, sillä $\frac{\sin r}{r} \leq 1$ kun $r > 0$. (Lisäksi $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\sin r}{r} = 1$, eli singulariteetti $r = 0$ on poistuva.) Kaksioisintegraali suppenee siis (ja

$$\iint_G \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} dA \leq \frac{\pi}{2} \int_0^2 dr = \pi).$$

3. Laske

$$\iiint_E \left(1 - \left[\left(\frac{x}{a} \right)^2 + \left(\frac{y}{b} \right)^2 + \left(\frac{z}{c} \right)^2 \right] \right) dV,$$

kun $E = \{(x, y, z) \mid \left(\frac{x}{a} \right)^2 + \left(\frac{y}{b} \right)^2 + \left(\frac{z}{c} \right)^2 \leq 1\}$. (Opastus: siirry aluksi uusiin muuttujiin u, v ja w siten, että $x = au, y = bv$ ja $z = cw$.)

Ratkaisu. Siirrytään siis koordinaatteihin u, v, w , missä $x = au, y = bv$ ja $z = cw$. Tällöin tullaan integroimaan yli yksikköpallon $S = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mid u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\}$, sillä

$$\left(\frac{x}{a} \right)^2 + \left(\frac{y}{b} \right)^2 + \left(\frac{z}{c} \right)^2 \leq 1 \Leftrightarrow u^2 + v^2 + w^2 \leq 1.$$

Lisäksi

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc,$$

joten $dV = |abc| du dv dw$. Saadaan

$$\begin{aligned} & \iiint_E \left(1 - \left[\left(\frac{x}{a} \right)^2 + \left(\frac{y}{b} \right)^2 + \left(\frac{z}{c} \right)^2 \right] \right) dV \\ &= |abc| \iiint_S (1 - [u^2 + v^2 + w^2]) du dv dw. \end{aligned}$$

Koska alue S on pallo, siirrytään nyt pallokoordinaatteihin ρ, ϕ, θ , jolloin $du dv dw = \rho^2 \sin \phi d\theta d\phi d\rho$, ja $u^2 + v^2 + w^2 = \rho^2$, ja

$$\begin{aligned} & \iiint_S (1 - [u^2 + v^2 + w^2]) du dv dw \\ &= \int_0^1 d\rho \int_0^\pi d\phi \int_0^{2\pi} (1 - \rho^2) \rho^2 \sin \phi d\theta \\ &= \int_0^1 (\rho^2 - \rho^4) d\rho \int_0^\pi \sin \phi d\phi \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^3}{3} - \frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 [-\cos \phi]_0^\pi = 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) (-(-1) + 1) = \frac{8\pi}{15}, \end{aligned}$$

joten

$$\iiint_E \left(1 - \left[\left(\frac{x}{a} \right)^2 + \left(\frac{y}{b} \right)^2 + \left(\frac{z}{c} \right)^2 \right] \right) dV = \frac{8}{15} \pi |abc|.$$

(Saa kyllä olettaa, että $a, b, c > 0$ jos haluaa.)

4. Laske pintaintegraali

$$\iint_S (x^2 + y^2) dS,$$

jossa \mathcal{S} on kartion $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ tasojen $z = 0$ ja $z = -3$ väliin jäävä osa. Fysikaalinen tulkinta?

Ratkaisu. Kartion yhtälö voidaan sylinterikoordinaateissa kirjoittaa $z^2 = 3r^2$. Kyseisessä alueessa $z \leq 0$, ja tämä osa kartiosta voidaan kirjoittaa

$z = -\sqrt{3}r$. Kun $-3 \leq z \leq 0$ kartiolla on siis $\sqrt{3} \leq r \leq 0$. Saadaan pinnalle parametriesitys

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = -\sqrt{3}r \end{cases} \quad 0 \leq r \leq \sqrt{3}, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Pintaelementti $dS = 2r \, d\theta \, dr$ voidaan määrätä geometrian perusteella, tai laskemalla

$$\begin{aligned} & \sqrt{\left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(r, \theta)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(r, \theta)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)}\right)^2} \, d\theta \, dr \\ &= \sqrt{3r^2 \cos^2 \theta + 3r^2 \sin^2 \theta + r^2} = 2r \, d\theta \, dr. \end{aligned}$$

Siispä

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{S}} (x^2 + y^2) \, dS &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq \sqrt{3} \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi}} r^2 \cdot 2r \, d\theta \, dr \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} r^3 \, dr \int_0^{2\pi} d\theta = 4\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{3}} = 9\pi. \end{aligned}$$

Olkoon pinnalla \mathcal{S} olevan massan pintatihey vakio σ . Koska $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ on pisteen (x, y, z) etäisyys z -akseliin on $I_z = \delta \iint_{\mathcal{S}} (x^2 + y^2) \, dS$ kyseisen pintamassan hitausmomentti z -akselin suhteen.